

## ПРОТОКОЛ НАДАННЯ ППД ЛЮДИНІ З НЕЗАКІНЧЕНИМ СУЇЦИДОМ

Незакінчений суїцид	Психологічні та організаційні заходи
<b>Ознаки:</b>	<b>Перший рівень</b>
Особа вчинила спробу самогубства.	Оцінити небезпечність ситуації для себе. Прибрати загрозу життю особи, що чинить спробу самогубства, за потреби надати необхідну медичну допомогу.
Може бути збудженим, тремтіти, плакати/може бути апатичним, байдужим/може бути спокійним зосередженим (якщо прийняв рішення довести спробу до кінця).	Не залишати наодинці (навіть якщо він виглядає спокійним), говорити з постраждалим (не бійтесь запитувати про суїцид, про те, чому він так вчинив, нехай виговориться, виплесне накопичені образи, горе тощо).
Може просити бути з ним, підтримати його чи навпаки, намагатися укритися з полю зору оточуючих.	Емоційно підтримати, не засуджувати.
	<p>Обов'язково порадити батькам/близьким звернутися до лікаря-психіатра.</p> <p><b>Другий рівень</b></p> <p>Обов'язково сказати батькам/близьким наглядати за потерпілим.</p> <p>Прийняти рішення щодо здійснення заходів постійного нагляду та психологічної чи медичної допомоги.</p> <p>Встановити свідків події, наближених (ті, що мають дружні, родинні зв'язки) осіб для подальшої профілактичної роботи з ними.</p> <p>За можливості організувати проведення дебрифінгу в перші три дні, залучивши психологів мобільного пункту психологічної підтримки.</p> <p style="text-align: center;"><b>Третій рівень</b></p> <p>Обов'язково врахувати висновки лікаря-психіатра і його рекомендації під час проведення подальшої реадаптації і корекції особи, яка вчинила спробу суїциду.</p>

